

PREPARACION

TOMA DE BIOPSIA TEJIDOS BLANDOS O MUSCULO

Le fecha de realización de su examen es el: _____

El sitio donde le van a realizar el examen es en la Clínica EMCOSALUD Neiva en la Calle 5 # 6 -73, segundo piso, Sala de Ecografía

1. EL DIA DE LA CITA DEBE:

- Traer la orden médica.
- Copia de historia clínica.
- Traer resultado exámenes de imagenología realizados recientemente: ecografías, tomografías, rayos x o resonancia, si estos exámenes **NO** fueron realizados en la clínica EMCOSALUD debe traer el disco con las imágenes.
- Traer reportes de tiempos de coagulación (TP y TPT), realizados en un tiempo no mayor a 10 días de la cita, verifique con el personal médico que estos estén dentro de los límites normales, también puede comunicarse a la clínica EMCOSALUD al 8632041 extensión 3, extensión 1130, 1140 y 1103, allí el personal médico le brindará información y le validará los resultados del examen.
- Presentarse 30 minutos antes, entregar los documentos y abrir admisión en la ventanilla ubicada en el 2º piso entre la sala de rayos y tomografía.
- Autorización de procesamiento de muestra para patología, Solicitarlo en la Calle 8 #10-45
- Traer consentimiento informado en blanco (este documento se diligenciará aquí en el momento previo a la realización del examen junto con el médico especialista).
- Traer un acompañante.
- Cumplir con la preparación del examen.

“Abajo te lo explicamos”

2. PREPARACION PARA EL EXAMEN

- Preséntese al examen con un ayuno mínimo de 8 horas
- Suspender tratamiento anticoagulante 5 días antes del procedimiento si lo está consumiendo, pregunte a su familia si usted no conoce cuáles son este medicamento, por ejemplo, Warfarina, ASA, aspirina, también puede comunicarse a la clínica EMCOSALUD al 8632041 extensión 3, extensión 1130, 1140 y 1103, allí el personal médico le brindará información y le validará los resultados del examen.
- Traiga un acompañante.
- Preséntese en ropa cómoda preferiblemente deportiva.



PREPARACION

3. DESPUES DEL EXAMEN

1. No se retire la gasa compresiva que le colocaron en el sitio de la punción hasta 24 horas después.
2. Solo puede tomar ACETAMINOFEN e IBUPROFENO para manejo del dolor ocasionado por el procedimiento.
3. Si presenta aumento en el dolor, enrojecimiento de la zona alrededor de donde le realizaron la punción u observa la salida de algún líquido extraño, acuda inmediatamente al servicio de urgencias.
4. Cuando salga del procedimiento, la enfermera le brindará información de cuando y donde reclamar el resultado de patología del estudio realizado.

Clínica EMCOSALUD



“ATENCION CON CALIDEZ”