# **PREPARACION**



## TOMA DE BIOPSIA DE TIORIDES

Le	fecha	de	realiza	ción	de su	examen	es el:	

El sitio donde le van a realizar el examen es en la Clínica EMCOSALUD Neiva en la Calle 5 # 6 -73, segundo piso, Sala de Ecografía

### 1. EL DIA DE LA CITA DEBE:

- Traer la orden médica.
- Copia de historia clínica.
- Resultado de laboratorio: TSH (Hormona estimulante de la tiroides la última realizada.
- Traer resultado de ecografía de tiroides, la ultima que realizada.
- Traer reportes de tiempos de coagulación (TP y TPT), tomado en un tiempo no mayor a 10 días de la cita, verifique con el personal medico que estos estén dentro de lo limites normales, también puede comunicarse a la clínica EMCOSALUD al 8632041 extensión 3, extensión 1130, 1140 y1103, allí el personal médico le brindara información y le validara los resultados del examen.
- Presentarse 30 minutos antes, entregar los documentos y abrir admisión en la ventanilla ubicada en el 2 piso entre la sala de rayos y tomografía.
- Autorización de procesamiento de muestra para patología.
- Traer consentimiento informado en blanco (este documento se diligenciará aquí en el momento previo a la realización del examen junto con el médico especialista).
- Traer un acompañante.
- Cumplir con la preparación del examen.

"Abajo te lo explicamos"

#### 2. PREPARACION PARA EL EXAMEN

- Preséntese al examen con un ayuno mínimo de 8 horas
- Suspender tratamiento anticoagulante 5 días antes del procedimiento si lo está consumiendo, pregunte a su familia si usted no conoce cuales son este medicamento, por ejemplo, Warfarina, ASA, aspirina, también puede comunicarse a la clínica EMCOSALUD a qq11 8632041 extensión 3, extensión 1130, 1140 y1103, allí el personal médico le brindara información y le validara los resultados del examen.
- Traiga un acompañante.
- Preséntese en ropa cómoda preferiblemente deportiva.



# **PREPARACION**



### 3. DESPUES DEL EXAMEN

- 1. No se retire la gasa compresiva que le colocaron en el sitio de la punción hasta 24 horas después.
- 2. Solo puede tomar ACETAMINOFEN e IBUPROFENO para manejo del dolor ocasionado por el procedimiento.
- **3.** Si presenta aumento en el dolor, enrojecimiento de la zona alrededor de donde le realizaron la punción u observa la salida de algún liquido extraño, acuda inmediatamente al servicio de urgencias.
- **4.** Cuando salga del procedimiento, la enfermera le brindara información de cuando y donde reclamar el resultado de patología del estudio realizado.

Clínica EMCOSALUD

"ATENCION CON CALIDEZ"